

تحقق منه. افحصه. تغلب عليه!

التشخيص المبكر
للسرطان قد
ينقذ الأرواح

سرطان عنق
الرحم

سرطان
الأمعاء

سرطان
الثدي

لا تتركه للصدفة، تحقق منه،
افحصه، تغلب عليه!

تحقق من الأعراض
اليوم. يمكن علاج
السرطان إذا اكتشف
في وقت مبكر بما فيه
الكفاية.

سرطان الأمعاء



للحصول على مزيد من المعلومات،
يرجى مسح رمز RQ أو التحدث إلى
طبيبك العام
خط المساعدة لفحص سرطان الأمعاء
0080 707 0606

سرطان عنق الرحم



للحصول على مزيد من المعلومات،
يرجى مسح رمز RQ أو التحدث إلى
طبيبك العام
خط المساعدة لفحص سرطان عنق الرحم
8080 208 9100

سرطان الثدي



للحصول على مزيد من المعلومات،
يرجى مسح رمز RQ أو التحدث إلى
طبيبك العام
خط المساعدة لفحص سرطان الثدي
8080 008 0006

لا تخاطري بذلك.

تحقق من الأعراض اليوم. يمكن
علاج السرطان إذا اكتشف في وقت
مبكر بما فيه الكفاية.

يعد التعرف على أعراض سرطان الأمعاء
وعنق الرحم/أمراض النساء وسرطان الثدي
أمرًا ضروريًا للاكتشاف المبكر والعلاج، مما
قد يزيد بشكل كبير من معدلات البقاء على
قيد الحياة. إن إدراكك للتغيرات في الجسم،
مثل النزيف غير المبرر أو الألم المستمر أو
الكتل أو الإفرازات غير العادية، قد يدفعك
إلى طلب المشورة الطبية في وقت مبكر.

يتيح التشخيص المبكر من خلال إدراك
الأعراض علاجات أكثر فعالية وأقل غازية،
مما يحسن فرص الشفاء ويقلل من خطر
حدوث مضاعفات.

تحدثي إلى طبيبك إذا
كنت غير متأكدة من
أي شيء



للحصول على هذه النشرة والمعلومات الأخرى بلغة
مختلفة، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة



سرطان الأمعاء

يُعدّ سرطان الأمعاء ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً. قد يساعد الفحص في الوقاية من سرطان الأمعاء أو الكشف عنه في مرحلة مبكرة، عندما يكون من الأسهل علاجه.

يموت أكثر من 00061 شخص بسبب سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة كل عام



الأعراض



نزيف من مؤخرتك



تغيير في عاداتك في التغوط. قد يتكرر ذهابك للمرحاض بشكل أكثر أو أقل أو تعاني من الإسهال أو الإمساك الذي قد يأتي ويزول.



الشعور بالتعب طوال الوقت ولكن سبب ذلك غير مؤكد



ألم أو كتلة في البطن



فقدان الوزن ولكن سبب ذلك غير مؤكد

إذا شعرت بشيء غير طبيعي بالنسبة لك، فاتصل بطبيبك

الفرز

مجموعة TIF

سيتم إرسال مجموعة TIF إلى عنوان منزلك الموجود في سجلات الممارس العام. تعمل المجموعة عن طريق كشط عصا أخذ العينات على البراز (الغائط) حتى يغطي طرف العصا التي تعاد بعد ذلك إلى زجاجة العينة. يُكتب التاريخ على الزجاجة ويُعاد إرسالها في الطرف المدفوع مسبقاً، مع تذكر أهمية إرسالها في اليوم نفسه

يخضع الجميع للفحص كل عامين

الذين تتراوح أعمارهم بين 05 إلى 47



بعمر 57 أو أكثر — اطلب إجراء فحص

الأعراض



نزيف مهبل غير عادي




نزيف مهبل بعد انقطاع الحيض




الألم وعدم الراحة أثناء ممارسة الجنس



إفرازات مهبلية كريهة الرائحة



ألم في الساق/الحوض



فقدان الوزن بشكل غير متوقع

إذا تلقت دعوة لأجراء اختبار اللطاخة في سن 42 عاماً، اعتماداً على عيد ميلادك، يمكنك الطلب من طبيبك/ممرضتك إعطائك لقاح VPH.

إذا شعرت بشيء غير طبيعي بالنسبة لك، فاتصل بطبيبك

الفرز

مسحة صغيرة

يتضمن الاختبار استخدام فرشاة ناعمة صغيرة لأخذ عينة من الخلايا على عنق الرحم. الاختبار ليس للتحقق من الإصابة بالسرطان ولكن للتحقق من أنواع فيروس الورم الحليمي البشري

تتراوح أعمارهن بين 05 إلى 46 سنة كل 5 سنوات

تتراوح أعمارهن بين 52 إلى 94 كل 3 سنوات



يجب على كل مريضة في عنق الرحم الخضوع لفحص عنق الرحم

سرطان عنق الرحم

يصيب سرطان عنق الرحم في الغالب النساء تحت سن 54 عاماً. يحدث بشكل عام بسبب الإصابة بأنواع معينة عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري (VPH)

يمكن الوقاية من 8.99% من حالات سرطان عنق الرحم في المملكة المتحدة.



الأعراض



كتلة في الثدي



تورم كل الثدي أو جزء منه



بشرة خشنة أو متراجعة



تغيرات انقلاب الحلمة



تصريف دموي



تهيج الجلد أو تغير في قوامه



الاحمرار والحرارة



كتلة مرئية على الإبط



إذا شعرت بشيء غير طبيعي بالنسبة لك، فاتصل بطبيبك

الفرز

تصوير الثدي بالأشعة السينية

سيتم إكمال 4 مرات مرتين على كل ثدي بنسبة 1 أو 2 من قبل موظفة.

يمكن للمرأة بعمر 17 عاماً أو أكثر الإحالة بنفسها

اللواري تتراوح أعمارهن بين 05 إلى كل 3 سنوات 17



سيستغرق الفحص حوالي 03 دقيقة.

سرطان الثدي

ينقذ الفحص حوالي حياة واحدة من سرطان الثدي لكل امرأة 002 يتم فحصهن. سيضيف هذا ما يصل إلى حوالي 0031 حياة تم إنقاذها من سرطان الثدي كل عام في KU.

يُعدّ سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في KU، حيث يمثل 51% من جميع حالات السرطان الجديدة،

