


# જોખમ ન લો.

આજે જ લક્ષણો તપાસો. જો વહેલી તકે કેન્સર પકડાઈ જાય તો તેનો ઈલાજ થઈ શકે છે.

વહેલી તકે કેન્સરના નિદાન અને સારવાર માટે આંતરડા, સર્વાઇકલ/ગાયનેકોલોજિકલ અને સ્ટન કેન્સરના લક્ષણોને ઓળખવા જરૂરી છે, જેનાથી જીવ બચાવવાના દરમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. શરીરમાં થતા ફૂરફારો, જેમ કે કોઈ કારણ વિના રક્તચાવ થવો, સતત પીડા, ગંઠો થવો અથવા અસામાન્ય ચ્છાવ વિશે જાગૃત રહેવાથી તમે વહેલી તકે તખીબી સલાહ લઈ શકો છો.

લક્ષણો અંગે જાગૃકતા દ્વારા પ્રારંભિક નિદાન કરાવવાથી વધુ અસરકારક અને ઓછી આક્રમક સારવાર થઈ શકે છે, સાજા થવાની શક્યતાઓ વધે છે અને જટીલતાનું જોખમ ઘટે છે.

જો કોઈ પણ બાબતે ગુંચવણમાં હોવ તો તમારા GP સાથે વાત કરો



આ પત્રિકા અને અન્ય માહિતી અલગ ભાષામાં મેળવવા માટે કૃપા કરીને QR કોડ સ્કેન કરો

આજે જ લક્ષણો  
તપાસો. જો વહેલી  
તકે કેન્સર પકડાઈ  
જાય તો તેનો ઈલાજ  
થઈ શકે છે.

તપાસ કરો.  
નિદાન કરો.  
ઈલાજ કરો!

કેન્સરનું વહેલું  
નિદાન જીવન  
બચાવી શકે છે

## આંતરડાનું કેન્સર

વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને QR  
કોડ સ્કેન કરો અથવા તમારા  
GP સાથે વાત કરો  
આંતરડાના કેન્સરના નિદાનની હેલ્પલાઇન  
- 0800 707 6060



## સ્ક્રીનિંગ

વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને QR  
કોડ સ્કેન કરો અથવા તમારા  
GP સાથે વાત કરો  
સર્વાઇકલ કેન્સરના નિદાનની હેલ્પલાઇન -  
0808 802 0019



## સ્ટન કેન્સર

વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને QR  
કોડ સ્કેન કરો અથવા તમારા GP  
સાથે વાત કરો  
સ્ટન કેન્સરના નિદાનની હેલ્પલાઇન -  
0808 800 6000



## સ્ક્રીનિંગ

## સ્ટન કેન્સર

તેને તક ન આપશો, તપાસ કરો, નિદાન  
કરો, ઈલાજ કરો!

## આંતરડાનું કેન્સર

UKમાં દર વર્ષે  
16,000થી વધુ  
લોકો આંતરડાના  
કેન્સરથી મૃત્યુ  
પામે છે

આંતરડાનું કેન્સર એ  
ત્રીજું સૌથી સામાન્ય  
પ્રકારનું કેન્સર છે. નિદાન  
કરવાથી આંતરડાનું  
કેન્સર થતું રોકી શકાય  
અથવા તેને પ્રારંભિક  
તબક્કે, જયારે તેની  
સારવાર કરવી સરળ  
હોય છે, ત્યારે શોધી  
શકાય છે.



## સ્કીનિંગ

UKમાંના 99.8%  
સર્વાઇકલ કેન્સરના  
કેસ અનેવા હોય છે જે  
અટકાવી શકાય છે.

સર્વાઇકલ/ગાયનેકોલોજિકલ નિદાનથી  
આ કેન્સર અટકાવી શકાય છે. તેમાં  
બુમન પેપિલોમાવાયરસ (HPV)  
નામના વાચરસનું પરીક્ષણ કરવામાં  
આવે છે. ઉચ્ચ જોખમના HPVના  
ડારણે સર્વાઇકલ ડોષો અસામાન્ય બની  
શકે છે. વાસ્તવમાં સર્વાઇકલ કેન્સરના  
તમામ કેસો ઉચ્ચ જોખમવાળા HPV  
સાથે સંકળાયેલા હોય છે.

## સ્તન કેન્સર

UKમાં કેન્સરના નવા  
નોંધતા કુલ કેસોમાંથી  
15% કેસ સાથે સ્તન  
કેન્સર અહીં જોવા  
મળતો કેન્સરનો સૌથી  
સામાન્ય પ્રકાર છે,

સ્તન કેન્સરના નિદાન  
દ્વારા પ્રત્યેક 200માંથી  
1 મહિલાનું જીવન  
બચાવી શકાય છે.  
આનાથી UKમાં દર વર્ષ  
સ્તન કેન્સરથી લગભગ  
1,300 લોકોનો જીવ  
બચી શકે છે.

## નિદાન કરો

- તમારા ગુદા માર્ગથી લોહી પડવું
- હંમેશાં થાક લાગે પરંતુ ચોક્કસ કારણ ખબર ન હોય
- તમને પેટમાં હુદ્દે અથવા ગહૂને થઈ ગયો હોય તેવું લાગે
- વજન ઘટવા લાગે પરંતુ ચોક્કસ કારણ ખબર ન હોય

જો તમને શરીરમાં કંઈક અસામાન્ય લાગે, તો તમારા GPનો સંપર્ક કરો

## નિદાન કરો

- થોનિમાર્ગમાં થી અસામાન્ય રક્તશ્વાવ
- થોનિમાર્ગમાં થી ગંધયુક્ત પ્રવાહીનો શ્વાવ
- સતત થાક લાગવો
- મેનોપોઝ પછી રક્તશ્વાવ
- પગ/પેટમાં પીડા
- જો તમારી જન્મતારીખના આધારે તમને 24 વર્ષની ઉંમરે તમારા સ્મીથર ટેસ્ટ માટે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે, તો તમે તમારા GP/નસરને તમને HPV રસ્તો આપવા માટે કહી શકો છો.
- સંલોગ રંગમાં પીડા અને અસ્વસ્થતા
- વજનમાં અનપેક્ષિત રીતે ઘટાડો

જો તમને શરીરમાં કંઈક અસામાન્ય લાગે, તો તમારા GPનો સંપર્ક કરો

## નિદાન કરો

- સ્તનમાં ગહૂં
- સ્તનની સ્થિતિ ઉલ્લિંઘન થઈ જાય
- ત્વચામાં લાલાશ અને ગરમ રહે
- સંપૂર્ણ સ્તનમાં અથવા અમૃત ભાગમાં સોજો
- લોહી નીકળે
- બગલ પર દેખીતો ગહૂં થાય
- ત્વચામાં ખાંખાં અથવા તેના દેખાવમાં ફેરફાર થાય
- ત્વચામાં ખાંખાં અથવા નિસેજ થઈ જાય

જો તમને શરીરમાં કંઈક અસામાન્ય લાગે, તો તમારા GPનો સંપર્ક કરો

## લક્ષણો

### ફીટ કીટ

GP રોક્ઝર્સમાં ઉલ્લેખિત તમારા ઘરના સરનામાં પર મોકલવામાં આવશે. કિટનો ઉપયોગ જ્યાં સુધી સ્ટીકનો છેડો ઢાકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી તમારા સ્ટૂલ (પ્રો) પર સેમ્પલિંગ સ્ટીકને સ્ક્રેપ કરીને કરવામાં આવે છે પરિણામો અને તેને સેમ્પલની બોટલમાં પાણી મૂઢી દેવામાં આવે છે. બોટલ પર તારીખ લખો અને તે જ દિવસે પ્રી-પેચ પરબીડિયામાં નાખીને પાછી મોકલી દો



જેમની ઉંમર  
50-74 હોય

દરેક વ્યક્તિનું દર  
2 વર્ષે નિદાન  
કરવામાં આવે છે

## લક્ષણો

### થોડી માત્રામાં સ્વેબ

આ પરીક્ષણમાં નાના નરમ ખણનો ઉપયોગ કરીને તમારા સર્વિક્સ પરના કોષોનું સેમ્પલ લેવામાં આવે છે.

આ પરીક્ષણ કેન્સરની તપાસ કરવા માટે નથી પરંતુ HPVના પ્રકારો તપાસવા માટે છે



જેમની ઉંમર  
25-49 વર્ષ હોય  
તેમને દર 3 વર્ષે

જેમની ઉંમર  
50-64 વર્ષ હોય  
તેમને દર 5 વર્ષે

સર્વિક્સ ધરાવતા દરેક વ્યક્તિએ સર્વાઇકલનું નિદાન કરાવવું જોઈએ

## લક્ષણો

### મેપોગ્રામ (એક્સસ-રે)

આ પ્રક્રિયા કુલ 4 વર્ષત્રણ પરિણામો કરાશે જેમાં સ્ટાફના મહિલા સભ્ય દ્વારા દરેક સ્તન પર 1 અથવા 2 વર્ષત્રણ કરીને 2 વર્ષત્રણ કરાશે.



જેમની ઉંમર 50-71  
હોય દર 3 વર્ષે

જેમની ઉંમર 71+  
હોય તેઓ જાતે  
કરવી શકે

નિદાનમાં લગભગ 30 મિનિટનો સમય લાગશે.